

What Should Parents Know



about Whooping Cough?

- Your baby needs 3 DTaP shots by 6 months to prevent whooping cough (pertussis).
- Babies under 6 months of age are at highest risk of getting sick.
- Whooping cough can cause babies to stop breathing or cough so much that they can't breathe. Babies can even die from it.



- Whooping cough is spread by coughing. Keep your baby away from anyone with a cough.
- Babies often catch whooping cough from older children and adults, usually family members.
- Ask everyone in your house to cover their mouths when coughing and wash their hands often.

**IMMUNIZING YOUR BABY ON TIME IS
THE BEST WAY TO PROTECT YOUR BABY.**



Lo que los padres necesitan saber...



...acerca de la tos ferina.

- Para prevenir la tos ferina, su bebé necesita 3 vacunas DTaP antes de los 6 meses.
- Los bebés menores de 6 meses de edad tienen el mayor riesgo de enfermarse.
- La tos ferina puede causar que los bebés dejen de respirar, o que tosan tanto que no puedan respirar. Los bebés pueden morir por esta causa.



- La tos ferina se contagia por la tos. Mantenga a su bebé alejado de cualquier persona que tenga tos.
- Con frecuencia, los bebés se contagian la tos ferina de otros niños y adultos, por lo general de sus familiares.
- Pida a todos en su casa que se tapen la boca cuando tosan y que se laven las manos con frecuencia.

Proteja a su bebé. Vacúnelo a tiempo.

